

Anghirol, 30 comprimate, Biofarm

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 8885/2016/01-02 Anexa 1

Prospect

ANGHIROL 3,25 mg comprimate

Extract uscat din Cynara (anghinare)

corespunzător la acizi cafeilchinici exprimați în acid clorogenic

Compoziție

Un comprimat conține extract uscat din Cynara (anghinare), corespunzător la acizi cafeilchinici exprimați în

acid clorogenic 3,25 mg și excipienți: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de magneziu.

Grupă farmacoterapeutică: Terapia vezicii biliare, alte preparate pentru terapia bilei, plante

Indicații terapeutice

Ca tratament adjuvant în tulburările dispeptice datorate insuficienței secretorii biliare precum și pentru

stimularea secreției și evacuării bilei la persoanele cu risc de litiază biliară.

Scăderea apetitului alimentar.

Preparatele de anghinare sunt folosite tradițional pentru favorizarea funcțiilor de eliminare digestivă și urinară.

Contraindicații

Alergie la anghinare, la plante din familia Composite sau la oricare dintre excipienții medicamentului.

Obstrucție biliară sau risc crescut pentru obstrucție biliară.

Insuficiență hepatică severă, insuficiență renală acută.

Copii sub 7 ani (datorită formei farmaceutice).

Precauții

Nu sunt necesare în cazul administrării corecte a medicamentului.

Interacțiuni

Nu sunt cunoscute.

Atenționări speciale

Nu se recomandă administrarea medicamentului la pacienții cu colici biliare litiazice sau hiperkinezie biliară.

Se recomandă prudență la pacienții cu litiază biliară.

Deoarece medicamentul conține lactoză monohidrat, administrarea nu este recomandată la pacienții cu

intoleranță ereditară la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbție de glucoză-galactoză.

Sarcina și alăptarea:

Nu există date care să evidențieze că medicamentul influențează sarcina sau alăptarea.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Adulți: doza recomandată este de 2 - 3 comprimate Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Copii între 7 și 10 ani: doza recomandată este de un comprimat Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Copii între 10 și 15 ani: doza recomandată este de 1 - 2 comprimate Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Reacții adverse

După doze mari pot să apară greață, amețeli, senzație de căldură.

2

Supradozaj

Nu au fost semnalate cazuri de supradozaj.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un blister din Al/PVC a 15 comprimate

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 15 comprimate

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Biofarm S.A.

Str. Logofătul Tăutu Nr. 99, București, România

Telefon: 021 30.10.600

Fax: 021 30.10.605

E-mail: office@biofarm.ro

Web: www.biofarm.ro

Data ultimei verificări a prospectului aprilie 2016.