

## Enterol, 250 mg, 10 plicuri, Dr. Reddys

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 13342/2020/01 Anexa 1

Prospect

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

ENTEROL 250 mg pulbere orală

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 liofilizat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luati întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

-Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

-Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

-Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

-Dacă după 2 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Enterol 250 mg și pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Enterol 250 mg

3. Cum să luați Enterol 250 mg

4. Reacții adverse posibile

5. Cum se păstrează Enterol 250 mg

6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Enterol 250 mg și pentru ce se utilizează

Enterol 250 mg este indicat:

-pentru tratamentul diareei infecțioase acute la adulți și copii;

-pentru prevenirea și tratamentul colitei și diareei determinate de consumul de antibiotice;

-în asociere cu vancomicină/metronidazol, pentru prevenirea recurenței bolilor produse de

*Clostridium difficile*;

-pentru prevenirea diareei determinate de nutriția enterală;

-pentru tratamentul sindromului colonului iritabil.

Dacă după 2 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Enterol 250 mg

Nu luați Enterol 250 mg:

-dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui

medicament (enumerat la pct.6);

-dacă aveți cateter venos central;

-dacă aveți intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție al glucozei și galactozei, deficit de

sucrază, izomaltază (datorită conținutului în fructoză);

-pacienți imunocompromiși sau spitalizați (din cauza bolilor grave sau a sistemului imunitar

modificat sau slăbit).

Atenționării și precauții

Înainte să luați Enterol 250 mg, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Tratamentul cu *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 nu înlocuiește rehidratarea, când aceasta este

necesară. Doza de rehidratare și calea de administrare (orală/ intravenoasă) trebuie adaptate la severitatea

diareei, la vârsta și starea de sănătate a pacientului.

2

Enterol 250 mg conține celule vii existând risc de infecții fungice sistemice.

Pacientul trebuie să țină cont de necesitatea consumului abundent de lichide sărate sau îndulcite (zahărul

trebuie fiert), pentru a compensa pierderile datorate diareei (la adult, aportul lichidian mediu este de 2 l pe

zi). De asemenea, în timpul diareei regimul alimentar trebuie să excludă anumite alimente, în special,

crudități, fructe și legume, alimente picante, precum și alimente și băuturi reci și să conțină mai ales friptură

la grătar și orez.

Dacă, după 2 zile de tratament, diareea persistă, conduita terapeutică trebuie reevaluată și trebuie avută în

vedere rehidratarea pe cale intravenoasă.

Enterol 250 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice

alte medicamente.

Datorită naturii sale fungice, Enterol 250 mg nu trebuie administrat simultan cu medicamente antifungice

orale sau sistemice.

Enterol 250 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool

Enterol 250 mg conține celule vii. Acest medicament nu trebuie deci combinat cu băuturi sau alimente

foarte fierbinți (peste 50°C) sau foarte reci sau cu alcool etilic.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă,

adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În studiile efectuate la animale nu s-a evidențiat potențial teratogen. Până în prezent, în clinică nu au fost

raportate efecte fetotoxice sau malformative. Datorită datelor insuficiente se recomandă evitarea utilizării

acestui medicament în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Enterol 250 mg nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Enterol 250 mg conține lactoză și fructoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm

să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

### 3. Cum să luați Enterol 250 mg

Luati întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de 1-2 plicuri Enterol 250 mg, de 1-2 ori pe zi.

Luati întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus

medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu

sunteți sigur.

Se varsă conținutul plicului în puțină apă sau băuturi îndulcite (zahărul trebuie fiert), se amestecă și se

bea. De asemenea, pulberea orală se poate combina cu alimente sau se poate turna în biberon.

Dacă luați mai mult Enterol 250 mg decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să luați Enterol 250 mg

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Enterol 250 mg

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

3

### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 este un organism viu asociat cu risc de infecție fungică sistemică:

cazuri rare de fungemie au fost raportate la pacienții cu stare gravă, spitalizați, cel mai adesea pentru boli

gastro-intestinale, cu cateter venos central.

Reacții adverse foarte rare:

-Pătrunderea drojdiei în sânge (fungemie).

Reacții adverse cu frecvență necunoscută:

- Constipație

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea

includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile

adverse direct prin intermediul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Enterol 250 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon. Data de expirare se referă

la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să

aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Enterol 250 mg

-Substanța activă este *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 liofilizat.

-Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, fructoză, dioxid de siliciu coloidal anhidru, aromă

artificială "tutti frutti".

Cum arată Enterol 250 mg și conținutul ambalajului

Cutie cu 10 plicuri cu pulbere orală.

Pulbere de culoare bej cu miros caracteristic.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul Autorizației de punere pe piață

BIOCODEX

7, avenue Gallieni 94250 Gentilly, Franța

4

Fabricant

BIOCODEX

1, avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Franța

Data ultimei revizuirii a prospectului

Iulie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>