

Tantum Verde cu aroma de menta, 3 mg, 20 pastile, Angelini

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 7149/2014/01-02 Anexa 1

Prospect

Prospect: Informații pentru utilizator

Tantum Verde cu aromă de mentă 3 mg pastile

Clorhidrat de benzidamină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

Dacă

manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tantum Verde și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde
3. Cum să utilizați Tantum Verde
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tantum Verde
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tantum Verde și pentru ce se utilizează

Tantum Verde conține clorhidrat de benzidamină și poate fi administrat ca tratament analgezic -

antiinflamator în afecțiunile cavității bucale și faringelui la adulți, adolescenți și copii cu vârsta

peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde

Nu utilizați Tantum Verde

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la clorhidrat de benzidamină sau la oricare dintre

celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

2

-dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic și/sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Tantum Verde, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aveți grijă deosebită când luați Tantum Verde:

- dacă aveți un istoric de astm bronșic.

Tantum Verde împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea

să utilizați orice alte medicamente.

Nu s-au semnalat interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți

gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest

medicament.

Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizați Tantum Verde.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Utilizarea locală a benzidaminei la dozele recomandate nu influențează capacitatea de a conduce

vehicule sau de a folosi utilaje.

Tantum Verde conține izomalt (care este un tip de zahăr).

Dacă aveți intoleranță la anumite zaharuri, întrebați medicul înainte de a utiliza acest medicament.

Tantum Verde conține aspartam (E 951). Este sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător pentru

persoanele cu fenilcetonurie.

3. Cum să utilizați Tantum Verde

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a

spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu

sunteți sigur.

Doza uzuală recomandată este de o pastilă Tantum Verde de 3 ori pe zi.

Pentru obținerea efectului maxim, este indicat să se lase pastila să se dizolve în gură.

Utilizarea la copii și adolescenți

Din cauza pericolului de sufocare (prin alunecarea pastilei în căile respiratorii), administrarea

pastilelor la copiii între 6-12 ani se face numai sub supravegherea unui adult.

Nu este recomandată administrarea pastilelor la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Durata tratamentului

Durata tratamentului nu trebuie să fie mai mare de 7 zile.

Dacă după administrarea Tantum Verde simptomele nu se ameliorează sau se agravează trebuie

să discutați cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

3

Dacă utilizați mai mult Tantum Verde decât trebuie

Trebuie să vă adresați imediat medicului.

Dacă uitați să utilizați Tantum Verde

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Tantum Verde

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Tantum Verde poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) poate să apară

fotosensibilitate (sensibilitate la lumină).

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

Poate să apară senzație de arsură și uscăciune a mucoasei bucale.

Dacă vi se întâmplă dumneavoastră, beți un pahar cu apă pentru a reduce aceste senzații.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Trebuie să discutați imediat cu medicul dacă brusc vi se umflă gura sau gâtul, sau apar dificultăți

la respirație.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută:

- reacție alergică (hipersensibilitate)

- reacție alergică gravă (șoc anafilactic), semne care pot include dificultăți de respirație, dureri în

piept sau senzație de apăsare în piept și/sau senzație de amețeală/leșin, mâncărime severă a pielii

sau noduli formați pe piele, umflare a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului și care pot pune viața în

pericol.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta

reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt

publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

<http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații

suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tantum Verde

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau folie după EXP. Data de

expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu utilizați Tantum Verde dacă observați semne vizibile de deteriorare.

4

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tantum Verde

-Substanța activă este clorhidratul de benzidamină. O pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg.

-Celelalte componente sunt: izomalt (E 953), levomentol, aspartam (E 951), acid citric

monohidrat, aromă de mentă, aromă de lămâie, galben de chinolină (E 104), indigotină (E

132).

Cum arată Tantum Verde și conținutul ambalajului

Tantum Verde se prezintă sub formă de pastile de culoare verde, translucide, de formă pătrată, cu

o cavitate centrală, cu gust caracteristic de mentă.

Ambalaj

Cutie cu 2 pachete din hârtie laminată cu aluminiu a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie

parafinată.

Cutie cu 3 pachete din hârtie laminată cu aluminiu a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie

parafinată.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

ANGELINI PHARMA ÖSTERREICH GmbH

Brigittenauer Lände 50 – 54, 1200 Viena, Austria

Fabricanții

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona,

Italia

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette

32290 Aignan,

Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a

deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2017.