

Compozitie

1 ml spray bucofaringian contine clorhidrat de benzidamina 1,5 mg si excipienti: etanol 96%, glicerol 85%, parahidroxibenzoat de metil, aroma de menta, zaharina, polisorbat 20, hidrogenocarbonat de sodiu, apa purificata.

Grupa farmacoterapeutica: alte preparate pentru tratament oral local.

Indicatii terapeutice

Tantum Verde, spray bucofaringian este indicat in tratamentul antiinflamator si analgezic al afectiunilor inflamatorii ale mucoasei oro-faringiene (**stomatita, faringita**) si ale gingiilor.

Tantum Verde, spray bucofaringian, este indicat, de asemenea, in stomatologie, dupa extractii dentare.

Contraindicatii

Hipersensibilitate la clorhidratul de benzidamina sau la oricare dintre excipientii produsului.

Precautii

Utilizarea indelungata poate produce fenomene de sensibilizare. In acest caz, pacientii trebuie sa intrerupa tratamentul si sa se adreseze medicului.

De asemenea, daca nu se obtin rezultate dupa o scurta perioada de tratament cu benzidamina, pacientii trebuie sa se adreseze medicului pentru reevaluarea diagnosticului si tratamentului.

Interactiuni

Nu au fost semnalate interactiuni cu alte medicamente utilizate concomitent pentru aceleasi indicatii.

Atentionari speciale

Sarcina si alaptarea

Nu sunt disponibile date suficiente privind utilizarea topica a benzidaminei in timpul sarcinii si alaptarii.

Daca este absolut necesar, benzidamina poate fi utilizata pentru administrare topica pe durata sarcinii sau la mamele care alapteaza.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Utilizarea locala a benzidaminei la dozele recomandate nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Adulti: 4-8 doze de 2-6 ori pe zi (fiecare doza este echivalenta cu 0,17 ml de solutie).

Copii (6-12 ani): 4 doze de 2-6 ori pe zi (fiecare doza este echivalenta cu 0,17 ml de solutie).

Copii sub 6 ani: o doza pentru fiecare 4 kg de greutate corporala, pana la doza maxima recomandata, echivalenta cu 4 doze de 2-6 ori pe zi (fiecare doza este echivalenta cu 0,17 ml de solutie).

Se recomanda sa nu se depaseasca doza prescrisa.

Mod de administrare

Ridicati canula atomizatoare.

Introduceti canula in cavitatea bucală si directionati-o spre zona inflamata sau spre gat in cazul afectiunilor faringelui. Apasati ferm cu degetul pe zona marcata.

La prima folosire, apasati pompa de cateva ori pana cand se ajunge la o eliminare constanta.

Reactii adverse

Ocazional a fost raportata senzatie de arsura locala, care se datoreaza etanolului continut.

Acest medicament contine o cantitate mica de alcool (etanol), <100 mg pe doza.

Excipientul parahidroxibenzoat de metil poate provoca reactii alergice (chiar intarziate).

Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj in cazul utilizarii locale a benzidaminei.

Pastrare

A nu se utilizeaza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj (dupa EXP.). Data de expirare se refera la ultima zi a lunii respective.

Nu sunt necesare conditii speciale de pastrare.

A nu se lasa la indemana si vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Intrebati farmacistul cum sa eliminati medicamentele care nu va mai sunt necesare. Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului.

Ambalaj

Cutie cu un flacon din PEID, prevazut cu pompa dozatoare si aplicator bucal a 30 ml spray bucofaringian.